


Thuốc trị bệnh viêm niệu đở nam

Written by Administrator

Monday, 26 December 2011 16:45 -

Viêm niệu đở nam có thể có hay không xuất từ từ niệu đở nhđng có ngđa, cảm giác kim châm, tiểu buđt. Viêm niệu đở nam có thể có nhiễm khuẩn hoặc không nhiễm khuẩn.

Theo hướng đởn của Trung tâm Kiểm soát bệnh Mđ (CDC) và đởn đởc ta đang áp đởng thì thuốc đởc dùng trong viêm niệu đở nam nhđ sau: Nếu xét nghiệm vi khuẩn (N. Gonorrhoeae, Ch, Tracomatis) cho kết quả đởng tính thì dùng azithromycin hoặc dùng doxycyclin phđi hợp với cefixim (uđng) hoặc tiêm bắp ceftriaxon. Nếu xét nghiệm vi khuẩn cho kết quả âm tính thì hoãn đởu trị. Ngođi đđ, nếu xét thđy nguy cđ bệnh lây truyền qua đởng tình đởc cao, ngđđi bệnh không có khả năng quay đđi thì vẫn có thể đởu trị theo phác đở trên. Do tình hình kháng thuốc cao nay không dùng fluoroquinolon trong đởu trị. Nếu ngđđi bệnh tđ ý dùng fluoroquinon thì cần xét nghiệm đđi vi khuẩn xem có thể t đđt hiđu quđ không.



Vi khuẩn

N. Gonorrhoeae - Mđt thđ phđm gây viêm niệu đở nam

Azithromycin cũng là thuốc đởc trị với các khuẩn gây viêm niệu đở không do đđu nhđ Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, cho nên dùng phác đđ azithromycin sẽ có hiđu quđ nếu bị nhiễm hai khuẩn này. Tuy nhiên, Mycoplasma genitalium có tính kháng azithromycin cao nên nếu dùng phác đđ này mà vẫn còn nhiễm Mycoplasma genitalium dai đởng thì kéo dài ngày đđn hay thay thế bằng thuốc khác.

đđng vùng có tđ đđ nhiễm Tricomonas (trùng roi) cao, vẫn dùng phác đđ này nhđng nên thêm metronidazol hay tinidazol vào phác đđ.

Thuốc trị bệnh viêm niệu đở o nam

Written by Administrator

Monday, 26 December 2011 16:45 -

Có nhđ ng nhiđ m khuđ n niđ u đđ o nam có triđ u chđ ng lâm sàng nhđ ng xét nghiđ m vi khuđ n cho kđ t quđ âm tính, dùng azithromycin thì các triđ u chđ ng do chúng gây ra cũng giđ m tđ i 85%, chđ ng tđ azithromycin có hiđ u lđ c trên các chđ ng này (Theo Maeda S-2009).

Cũng theo mđ t sđ nghiên cđ u mđ i đây cho biđ t: Viêm niđ u đđ o nam do giang mai đđ ngđđ i nhiđ m HIV thì dùng azithromycin cho kđ t quđ 76,8%, tđ đđ ng đđ đđ ng vđ i kđ t quđ tiêm penicillin chđ m 78,5% (theo Journal Watch Infectious Disease May 5,2010). Nhđ vđ y trong trđ đđ ng hđ p này thì viđ c dùng phác đđ azithromycin là có lđ i.

Sau đđ u trđ viêm niđ u đđ o nam 3 tháng, cđ n tái khám, đđ u trđ lđ i theo phác đđ azithromycin dùng trong 5 ngày, hay doxycilin dùng trong 7 ngày kđ t hđ p vđ i metronidazol dùng 1 liđ u duy nhđ t.

Mđ c đđch đđ u trđ viêm niđ u đđ o nam là nhđ m giđ m triđ u chđ ng, nhđ n diđ n và chđ ng các nhiđ m khuđ n, các bđ nh lây truyđ n qua đđ đđ ng tình đđ c, các nhiđ m khuđ n không lđ u, làm giđ m các đđ u kiđ n thuđ n lđ i gây bđ nh lây truyđ n qua đđ đđ ng tình đđ c, kđ cđ HIV. Azithromycin theo trên nhđ mđ t kháng sinh đa năng đđ đđ c các mđ c đđch đđ u trđ này.

[Miđ n phí](#) [Ads by NhutCorp](#) [Internet](#) [Thiđ t kđ website](#) [Email marketing](#) _